

Demetrina 25 EC

- › INSETTICIDA PIRETROIDE CHE AGISCE PER CONTATTO ED INGESTIONE
- › AMPIO SPETTRO D'AZIONE

COMPOSIZIONE
deltametrina 2,8%
(25 g/l)

CODICE IRAC
3A

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

BUFFER ZONE
Consultare il riferimento
della sezione dedicata
(pag. 22)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H226; H302; H304; H315;
H318; H336; H410; EUH401



Pericolo

REG. MIN. SALUTE
n° 16797 del 11.07.2016

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro	Afidi	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)		30 gg	1
	Cocciniglia mezzo grano di pepe, Mosca della frutta	50 ml/hl (0,5 l/ha)			
Mandarino, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo	Afidi	30 ml/hl (420-500 ml/ha)	Ripetere ogni 14 gg	30 gg	2
	Cydia	50 ml/hl (420-500 ml/ha)			
	Vespa dei semi del pistacchio	50 ml/hl (500 ml/ha)	Ad inizio volo degli adulti		
Melo, Pero, Cotogno, Nespole	Cydia, Psilla, Afidi	30-50 ml/hl (300-500 ml/ha)	Ripetere a distanza di 14 gg	7 gg	2
	Ricamatori	35 ml/hl (350-500 ml/ha)			
	Psilla del Pero	50 ml/hl (500 ml/ha)			
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio	Ricamatori, Anarsia	35 ml/hl (350-490 ml/ha)		7 gg	1
	Mosca delle ciliegie	40-50 ml/hl (400-700 ml/ha)			
	Mosca della frutta	50 ml/hl (500-700 ml/ha)			
	Afidi, Cydia	30-50 ml/hl (300-700 ml/ha)			
Vite da tavola e da vino	Tignoletta (1ª generazione), Empoasca	50 ml/hl (500 ml/ha)	Ripetere ogni 14 gg	7 gg	3
	Tignoletta (2ª generazione), Tignola	50-70 ml/hl (500-700 ml/ha)			
Mais	Piralide, Sesamia, Nottue, Afidi	300-500 ml/ha	Ripetere ogni 14-21 gg	30 gg	3
	Diabrotica	500 ml/ha	Ripetere ogni 7-14 gg		
Fruento, Orzo, Avena, Segale	Afidi, Agrotis	300-500 ml/ha		30 gg	1
Fragola (campo e serra)	Afidi	50 ml/hl (250-500 ml/hl)	Ripetere ogni 14 gg	3 gg	3
Olivo	Mosca, Cocciniglia mezzo grano di pepe	50 ml/hl (500-700 ml/ha)	Per la Mosca intervenire in funzione delle catture degli adulti	7 gg	1
	Euphyllura	35-50 ml/hl (300-700 ml/ha)			
	Tignola	30-50 ml/hl (500-700 ml/ha)	30 ml/hl per la generazione antofoga		



AVVERTENZE

Bagnare uniformemente la vegetazione. In caso di colture di difficile bagnatura aggiungere un idoneo bagnante (es. Vector).

Demetrina 25 EC

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Cipolla, Porro, Aglio, Tabacco	Tripidi, Nottue	300-500 ml/ha	Intervallo tra i trattamenti di 7 gg per Tabacco, 14 gg per le altre colture	7 gg	3
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero (campo e serra)	Nottue fogliari, Afidi, Dorifora (Solanacee)	50 ml/hl (300-500 ml/ha)	Ogni 14 gg per Pomodoro, Melone, Cocomero in campo, 7 gg altre colture. *max 300 ml/ha in campo	3 gg	4 peperone e melanzana in serra; 3 altre colture
	Cimice verde (Solanacee)	30 ml/hl (180-420 ml/ha)*			
	Agrotis (in campo)	300-500 ml/ha			
	Mosca bianca (peperone in serra)	70 ml/hl (420-500 ml/ha)			
Cavoli (eccetto C. cinese, C. riccio, C. rapa), Cavolfiori, Broccoli	Cavolaia, Nottue fogliari, Afidi, Agrotis	300-500 ml/ha	Intervenire a distanza di 14 gg	7 gg	2
Lattuga (in campo), Prezzemolo, Foglie di sedano, Rucola	Nottue fogliari, Afidi	50 ml/hl	Intervenire a distanza di 14 gg Nottue fogliari, Afidi: dose max 500 ml/ha per lattuga, 350 ml/ha per le altre colture	3 gg	2
	Agrotis	300-500 ml/ha			
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia	Nottue fogliari, Afidi, Agrotis	300-500 ml/ha	Intervenire a distanza di 14 gg	7 gg	2
Pisello	Afide, Sitona	250 ml/ha	Intervenire a distanza di 14 gg	7 gg	2
	Afide nero, Tignola, Tripide, Agrotis	300-500 ml/ha			
Carciofo	Cassida	500 ml/ha	Intervenire a distanza di 7 gg	3 gg	3
	Nottue fogliari, Afidi	300-500 ml/ha			
Patata	Dorifora	500 ml/ha	Intervenire a distanza di 14 gg	7 gg	3
	Nottue fogliari	300-500 ml/ha			
Cotone (solo uso tessile)	Tignola, Nottua	500-700 ml/ha	Intervenire a distanza di 14 gg	30 gg	2
	Bemisia, Empoasca	500 ml/ha			
	Spodoptera, Aifdi, Agrotis	300-500 ml/ha			
Barbabietola da zucchero, Bietola rossa	Afidi, Mosca, Altica, Nottue	300-500 ml/ha		30 gg	
	Cassida	500 ml/ha			
Erba medica	Afidi, Hypera postica	250 ml/ha	Intervallo tra i trattamenti di 14 gg	14 gg	2
Ornamentali (campo e serra)	Afidi, Tripidi	50 ml/hl (250-500 ml/ha)	Intervenire a distanza di 7 gg	n.r.	3
	Mosca bianca	70 ml/hl (500 ml/ha)			
	Archips, Adoxophyes, Pandemis	35 ml/hl (175-350 ml/ha)			

FLACONE
1 litro (cartone 10 pz)

