

Deltagri

DELTAGRI è un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego. Il prodotto si impiega in trattamenti alla vegetazione alla comparsa degli insetti controllati, se non diversamente specificato.

Composizione:

Deltametrina pura g 2,8 (25 g/L)

Formulazione:

Concentrato emulsionabile (EC)

N° di registrazione:

15537 del 20.01.2014

Indicazioni di pericolo:

PERICOLO

H226 - H302 - H304 - H315 - H318 - H336 - H410 - EUH401

Confezione:

L 1

Intervallo di sicurezza:

30 gg per agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbabietola da zucchero; 14 gg per erba medica; 7 gg per pomacee, drupacee, vite, olivo, patata, cavoli (eccetto cavolo cinese, cavolo riccio e cavolo rapa), cavolfiore, broccoli, pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava, aglio, cipolla, porro, tabacco, bietola rossa; 3 gg per fragola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero, lattuga, carciofo, prezzemolo, foglie di sedano, rucola.



Colture	Avversità	Dose	Note
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo, Arancio Amaro)	Afidi (<i>Myzus persicae</i>) Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>), Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	30-50 mL/hL 50 mL/hL	
Frutta a guscio (Mandorlo, Noce, Castagno, Pistacchio, Nocciolo)	Afidi (<i>Hyalopterus spp.</i>) Cydia (<i>Laspeyresia</i>) pomonella, Cydia (<i>Laspeyresia</i>) splendana Vespa dei semi del pistacchio (<i>Eurytoma plotnicovi</i>)	30 mL/hL 50 mL/hL 50 mL/hL	
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Cydia (<i>Laspeyresia</i>) pomonella, Psilla del melo (<i>Psylla mali</i>), Afidi (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis plantaginea</i>) Ricamatori (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>) Psilla del pero (<i>Psylla pyri</i>)	30 - 50 mL/hL 35 mL/hL 50 mL/hL	
Drupacee (Pescio, Nettare, Albicocco, Susino, Ciliegio)	Ricamatori (<i>Adoxophyes orana</i> , <i>Archips rosanus</i>), Anarsia lineatella Mosca delle ciliegie (<i>Rhagoletis cerasi</i>) Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>) Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus cerasi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i>), Cydia (<i>Laspeyresia</i>) funebrana	35 mL/hL 40 - 50 mL/hL 50 mL/hL 30 - 50 mL/hL	
Vite (da tavola e da vino)	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>) Tignola (<i>Clysia ambiguella</i>) <i>Empoasca spp.</i>	50 mL/hL 50 - 70 mL/hL 50 - 70 mL/hL 50 mL/hL	1° generazione. 2° e 3° generazione.
Fragola (in campo e in serra)	Afidi (<i>Aphis spp.</i>)	50 mL/hL	
Olivo	Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>) <i>Euphyllura spp.</i> Tignola (<i>Prays oleae</i>)	50 mL/hL 50 mL/hL 30 - 50 mL/hL 30 mL/hL 50 mL/hL	Gen. antofaga. Gen. carpofaga.
Cipolla, Porro, Aglio	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>), Nottue (<i>Agrotis spp.</i>)	300 - 500 mL/ha	
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in campo)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>) Cimice (<i>Nezara viridula</i>) Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)	50 mL/hL 30 mL/hL 300 - 500 mL/ha	
Peperone (in serra)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>) Cimice (<i>Nezara viridula</i>) Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50 mL/hL 30 mL/hL 70 mL/hL	
Pomodoro, Melanzana (in serra)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp.</i>), Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anuraphis cardui</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>) Cimice (<i>Nezara viridula</i>)	50 mL/hL 30 mL/hL	

Colture	Avversità	Dose	Note
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero (in campo e serra)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Afidi (<i>Aphis</i> spp., <i>Hyperomyzus lactucae</i>)	300 - 500 mL/ha	
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero (in campo)	Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
Cavoli (eccetto Cavolo Cinese, Cavolo Riccio e Cavolo Rapa), Cavolfiore, Broccoli	Cavolaia (<i>Pieris</i> spp.), Nottue fogliari (<i>Mamestra brassicae</i> , <i>Plusia gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.) <i>Plutella xylostella</i>	300 - 500 mL/ha 500 mL/ha	
Lattuga (in campo)	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i>), Afidi (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i> , <i>Aphis</i> spp.) Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	50 mL/hL 300 - 500 mL/ha	
Prezzemolo, Foglie di Sedano, Rucola	Afidi (<i>Aphis</i> spp.), Nottue fogliari (<i>Spodoptera exigua</i> , <i>Mamestra</i> spp., <i>Chrysodeixis chalcites</i>) Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	50 mL/hL 300 - 500 mL/ha	
Fagiolo, Fava, Cece, Lenticchia	Nottue fogliari (<i>Helicoverpa armigera</i>), Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis</i> spp.), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
Pisello	Afide (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), <i>Sitona</i> spp. Afide nero (<i>Aphis fabae</i>), Tignola (<i>Laspeyresia nigricana</i>), Tripide (<i>Thrips angusticeps</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	250 mL/ha 300 - 500 mL/ha	
Carciofo	<i>Cassida</i> sp. Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i>), Afidi (<i>Anuraphis cardui</i> , <i>Myzus persicae</i>)	500 mL/ha 300 - 500 mL/ha	
Patata	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Nottue fogliari (<i>Spodoptera littoralis</i>)	500 mL/ha 300 - 500 mL/ha	
Cotone (per uso tessile)	Tignola (<i>Pectinophora gossypiella</i>), Nottua (<i>Helicoverpa armigera</i>) <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Empoasca</i> spp. <i>Spodoptera</i> spp., afidi (<i>Aphis gossypii</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	500 - 700 mL/ha 500 mL/ha 300 - 500 mL/ha	
Tabacco	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>), Nottue terricole (<i>Agrotis</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
Barbabietola da Zucchero, Bietola Rossa	Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Mosca (<i>Pegomya</i> spp.), Altica (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Nottue (<i>Agrotis</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	300 - 500 mL/ha	
Mais	Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Sesamia (<i>Sesamia nonagroides</i>), Nottue (<i>Agrotis</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp., <i>Helicoverpa armigera</i>), Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>) <i>Diabrotica virgifera</i>	300 - 500 mL/ha 500 mL/ha	
Frumento, Orzo, Segale, Avena	Afidi (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), <i>Agrotis</i> spp.	300 - 500 mL/ha	
Erba medica	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Apion pisi</i>), <i>Hypera postica</i>	250 mL/ha	
Ornamentali (in campo e in serra)	Afidi (<i>Myzus</i> spp.), Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>) Mosca bianca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Lepidotteri (<i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp.) Lepidotteri (<i>Archips</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp., <i>Pandemis</i> spp.)	50 mL/hL 70 mL/hL 35 mL/hL	